

Prospecto: información para el usuario

ACEITE DE RICINO ORRAVAN 1g/ml líquido oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo

. Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora tras la toma del medicamento.

Contenido del prospecto

1. Qué es ACEITE DE RICINO ORRAVAN y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar ACEITE DE RICINO ORRAVAN
3. Cómo tomar ACEITE DE RICINO ORRAVAN
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de ACEITE DE RICINO ORRAVAN
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es ACEITE DE RICINO ORRAVAN 1g/ml líquido oral y para qué se utiliza

Pertenece a un grupo de medicamentos denominados laxantes de contacto

ACEITE DE RICINO ORRAVAN es un laxante purgante cuyo principio activo el aceite de ricino, está indicado para facilitar el vaciado intestinal. .

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora tras la toma del medicamento.

2. Que necesita saber antes de empezar a tomar ACEITE DE RICINO ORRAVAN 1g/ml líquido oral

No tome ACEITE DE RICINO ORRAVAN :

- Si es hipersensible (alérgico) al aceite de ricino
- No administre este medicamento a niños menores de 12 años.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Si padece afecciones del colon inflamatorias (rectocolitis ulcerosa, enfermedad de Crohn...)
- Si padece dolor abdominal de origen desconocido, pues podría enmascarar un cuadro clínico más grave.
- En situaciones en que el tránsito intestinal se encuentra dificultado o impedido, como obstrucción intestinal u oclusión intestinal, estenosis del tracto digestivo, íleo paralítico, íleo espástico, impactación fecal.
- Si padece náuseas, vómitos, calambres y dolor abdominal, pues podrían ser síntomas de apendicitis..
- Si presenta una situación clínica de deshidratación con pérdida de líquidos y electrolitos.

nauseas o vómitos.

Advertencias y precauciones

Antes de iniciar el tratamiento, el paciente debe estar correctamente hidratado y sus niveles de electrolitos ser normales. El ACEITE DE RICINO ORRAVAN es un laxante- purgante fuerte, que puede causar deshidratación, desequilibrio hidrolítico e hipopotasemia,

- El uso prolongado de los laxantes debe ser evitado. Si necesita el uso de laxantes con regularidad, se debe evaluar la causa del estreñimiento.
- Este medicamento está indicado para ser tomado de una sola vez, no obstante el abuso de los laxantes, puede dañar la función intestinal, pudiendo aparecer los síntomas típicos como dolor abdominal, debilidad, fatiga, sed, vómitos, dolor óseo (debido a osteomalacia) desequilibrio de fluidos y electrolitos y diarrea. Asimismo el tránsito intestinal se acelera pudiéndose producir una reducción en la absorción de nutrientes. Si bien el intestino no resulta dañado permanentemente, se puede necesitar varios meses hasta readaptar el intestino a la normalidad.
- El aceite de ricino debe ser utilizado solo cuando no se ha podido conseguir una función intestinal normal mediante el cambio de los hábitos alimenticios o de laxantes formadores de masa fecal como por ejemplo plantago.
- Por lo general los laxantes deben usarse con precaución en ancianos debido a que pueden exacerbar estados de debilidad, hipotensión e incoordinación psicomotriz.
- No se recomienda el uso del medicamento en niños menores de 12 años, ya que no se dispone de estudios adecuados para establecer la seguridad y eficacia del tratamiento.

Si los síntomas persisten o empeoran durante el uso del medicamento, se debe consultar al médico o farmacéutico.

Uso de ACEITE DE RICINO ORRAVAN con otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

Debido a que este tipo de laxantes disminuye el tiempo de tránsito intestinal, el uso simultáneo de otros fármacos con este laxante puede disminuir la absorción de éstos .

- No se recomienda el uso simultáneo del aceite de ricino con: Antiarrítmicos como: sotalol, amiodarona.
- Diuréticos, adrenocorticoides o con preparados de raíz de regaliz porque puede potenciar la pérdida de potasio.
- Digitálicos (medicamentos que aumentan la velocidad de contracción del corazón) debido al riesgo de provocar hipocaliemia que favorece los efectos tóxicos de éstos.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Embarazo

Los efectos estimulantes del aceite de ricino pueden provocar contracciones uterinas en mujeres embarazadas. No debe utilizarse ACEITE DE RICINO ORRAVAN durante el embarazo

Lactancia

No se dispone de información suficiente relativa a la excreción del aceite de ricino en la leche materna. Se recomienda no usar este medicamento durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas:

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

3. Cómo ACEITE DE RICINO ORRAVAN

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda consulte de nuevo a su médico o farmacéutico

La dosis recomendada es

Adultos 25 ml en una única toma

ACEITE DE RICINO ORRAVAN se administra en ayunas por la mañana.

Se puede tomar mezclado con leche, zumo de frutas o bebidas carbonatadas refrigeradas, lo que mejora la tolerancia.

La evacuación se produce entre 2 y 6 horas después de la toma del aceite de ricino. No se recomienda tomar el medicamento a última hora del día o antes de dormir

Uso en niños y adolescentes

No utilizar en niños menores de 12 años

Ancianos

Por lo general los laxantes deben usarse con precaución en ancianos debido a que pueden agravar estados de debilidad, hipotensión e incoordinación psicomotriz.

Si toma más ACEITE DE RICINO ORRAVAN

Se puede producir un agravamiento de los efectos adversos descritos, irritación gastrointestinal, diarrea y pérdida de fluidos y electrolitos. En estos casos se realizará el tratamiento sintomático necesario, con rehidratación y restablecimiento de fluidos y electrolitos en caso de existir una pérdida importante de fluidos.

Si olvido tomar ACEITE DE RICINO ORRAVAN

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas

Si interrumpe el tratamiento con ACEITE DE RICINO ORRAVAN

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento pregunte a su médico o Farmacéutico

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos aunque no todas las personas lo sufran.

Se pueden producir náuseas, vómitos, dolor cólico, dolor abdominal y diarrea severa. Se desconoce la frecuencia de aparición de estos efectos. Si se produjeran éstas u otras reacciones adversas no mencionadas anteriormente, se debe consultar al médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de los efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico,

incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, Website: www.notificaram.es
Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de ACEITE DE RICINO ORRAVAN

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance y de la vista de los niños.
Conservar el frasco en el embalaje exterior para proteger de la luz y humedad

No utilice ACEITE DE RICINO ORRAVAN después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de **ACEITE DE RICINO ORRAVAN 1g/ml líquido oral**

Cada ml de líquido oral contiene 1 g de aceite de las semillas de *Ricinus communis* L.

Aspecto del producto y contenido del envase

Este medicamento se presenta en frasco transparente de tapón de rosca conteniendo 25 ml de aceite de ricino

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A.
C/ Gran Capitán 10,
08970 Sant Joan Despí Barcelona
España

Fecha de la última revisión de este prospecto: Diciembre 2017

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
<http://www.aemps.es/>